

Virkon® S

Złoty standard w dezynfekcji.



150 Years
Science For A Better Life

 **25 lat**
doświadczenia
w dezynfekcji

 skuteczność
przeciwko
500
PATOGENOM

 **NAWET**
w **10**
minut

 **SKUTECZNY**
w niskich
4°C
temperaturach

BAKTERIA

VIRKON S KONTRA BAKTERIE

SALMONELLOZA DROBIU

Salmonellozy drobiu stanowią poważny problem ekonomiczny w hodowli i produkcji drobiu oraz epidemiologiczny ze względu na możliwość spowodowania zatrucia pokarmowych u ludzi.

Słowo salmonelloza wywołuje dreszcze na skórze każdego producenta drobiu. Spowodowane jest to nie samym procesem chorobowym, ale konsekwencjami jakie niesie za sobą wykrycie obecności salmonelli w obiekcie, a w konsekwencji u drobiu i w jajach. Takich ptaków trudno jest się nawet pozbyć. Konsekwencje postępowania zarówno z zakażonymi tuskami, jak i z linią produkcyjną po uboju są ściśle określone (instrukcje) i finansowo bardzo obciążające. O zysku trzeba zapomnieć. Do tego dochodzi zła renoma, co rzutować może na przyszłą współpracę z odbiorcą towaru. Dodatkowo pojawiają się kontrole weterynaryjne i związane z nimi nakazy i obowiązki. Wszystkie one obciążają kosztami producenta drobiu. Skąd wziąć na to środki?

Niestety pytanie pozostanie bez odpowiedzi, o ile wcześniej nie przypomnimy sobie, że najtańszym sposobem ograniczenia rozprzestrzeniania się bakterii w środowisku (również salmonelli) jest – bioasekuracja i jej integralna część – dezynfekcja.

Sięgnij po preparaty oferowane przez firmę Bayer, zapytaj nas o program bioasekuracja w obiektach dla drobiu. Skorzystaj z fachowego doradztwa technicznego. Wiedza, którą dzielimy się z Tobą pochodzi z doświadczeń milionów zastosowań z obiektów na całym świecie. Pytaj. Pytanie nic nie kosztuje.



wysoka
2x
1l
wydajność

CZY WIESZ, ŻE:

- Stosując Virkon S w rozcieńczeniu 1:100 możesz skutecznie walczyć z salmonellą w środowisku.
- Virkon S wyróżnia się wśród innych środków doskonałym działaniem w niskich temperaturach (+4st C), wysoką skutecznością bójczą w niskich stężeniach (zaledwie 0,5 % roztwór), krótkim czasem oddziaływania na patogen (10 min) oraz całkowitą biodegradowalnością (do dwutlenku węgla i wody).

Szczegółowych informacji udziela:

Bayer Sp. z o.o., Dział Weterynaryjny, Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, tel. 22 572 36 63, fax 22 572 36 53, www.weterynaria.bayer.com.pl

PRODUKT BIOBÓJCZY NALEŻY UŻYWAĆ Z ZACHOWANIEM SZCZEGÓLNYCH ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI. PRZED UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ ETYKIETĘ I UŁOTKĘ INFORMACYJNĄ.